

Apêndice F - Lista das espécies de aves registradas na Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores, municípios de Betim e Contagem, Minas Gerais, em dezembro de 2017 e maio de 2018. Fonte: Bio Teia Estudos Ambientais Eireli ME.

Registro: A – auditivo; V – visual; (f) – fotografia. Hábitats: F – florestais (inclui fragmentos de mata, matas ciliares, eucaliptais); S – savânicos (inclui campos, cerrado *sensu stricto*, pastagens); J – jardins (inclui pomares, gramados e entorno de construções); U – áreas úmidas (inclui corpos d’água, tais quais lagos, represas, brejos, e vegetação associada, que pode ser herbácea, arbustiva ou arbórea); A – aéreo (registros de indivíduos que estavam sobrevoando a área). Bacia Hidrográfica: “x” indica registro na bacia. IFL: Índice de Frequência nas Listas de Mackinnon de 10 espécies cada ($n = 222$ listas). Sensibilidade a distúrbios antrópicos (Sens.): A – alta; M – média; B – Baixa; (NI) – não informado (STOTZ et al. 1996). Ameaça & Endemismo (Am. & End.): MA – endêmica da Mata Atlântica (STOTZ et al. 1996); CE – endêmica do Cerrado (SILVA; BATES, 2002); VU(GL) – ameaçada de extinção globalmente, categoria “vulnerável”(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018); QA(BR) = “quase-ameaçada” de extinção no Brasil (ICMBio 2014). *Indica espécies de aves (dependentes) de áreas úmidas (segundo Accordi 2010 e Stotz et al. 1996). Nomes e ordenação dos táxons seguem última revisão do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO; Piacentini et al. 2015).

Aramidae*Aramus guarauna* (Linnaeus, 1766)*

carão V A (f) U x x x x x 0,050 M

Rallidae*Aramides cajaneus* (Statius Muller, 1776)*

saracura-três-potes V A (f) F U J x x x x x 0,032 A

Aramides saracura (Spix, 1825)*

saracura-do-mato A U x x x x x 0,009 M MA

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)*

sanã-parda A U x x x x x 0,014 B

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)*

saracura-sanã V A U x x x x x 0,077 M

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)*

galinha-d'água V A (f) U x x x x x 0,095 B

CHARADRIIFORMES**Charadriidae***Vanellus chilensis* (Molina, 1782)*

quero-quero V A (f) A S U J x x x x x x 0,108 B

Jacanidae*Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)*

jaçanã V (f) S U x x x x x 0,018 B

COLUMBIIFORMES**Columbidae***Columbina talpacoti* (Temminck, 1810)

rolinha V A S F U J x x x x x x 0,149 B

Columbina squammata (Lesson, 1831)

fogo-apagou V A S U J x x x x x 0,054 B

Columba livia Gmelin, 1789

pombo-doméstico V A S J x x x x x 0,018 B

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

asa-branca V A (f) A S F U J x x x x x 0,284 M

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

avoante A S x x x x x 0,005 B

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)

juriti-de-testa-branca A S F x x x x x 0,018 M

CUCULIFORMES**Cuculidae***Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)

alma-de-gato V A S F U J x x x x x 0,068 B

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

anu-preto V A (f) S U J x x x x x 0,072 B

Guira guira (Gmelin, 1788)

anu-branco V A S U J x x x x x 0,032 B

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

saci A S J x x x x x 0,032 B

STRIGIFORMES**Strigidae***Megascops choliba* (Vieillot, 1817)

corujinha-do-mato A F U J x x x x x 0,000 B

Bubo virginianus (Gmelin, 1788)*

jacurutu A F x x x x x 0,000 B

Athene cunicularia (Molina, 1782)

coruja-buraqueira V A (f) S U J x x x x x 0,018 M

NYCTIBIIFORMES**Nyctibiidae***Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)

urutau

A

U

x

0,000

B

CAPRIMULGIFORMES**Caprimulgidae***Antrostomus rufus* (Boddaert, 1783)

joão-corta-pau

A

F

x

0,000

B

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

bacurau

V A (f)

S

J

x

x

x

x

x

0,005

B

APODIFORMES**Apodidae***Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796)

taperuçu-de-coleira-branca

V A

A

x

0,005

B

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907

andorinhão-do-temporal

V A

A

x

x

x

x

0,027

B

Trochilidae*Phaethornis ruber* (Linnaeus, 1758)

rabo-branco-rubro

V

F

x

0,005

M

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)

rabo-branco-acanelado

V A (f)

F U J

x

x

x

x

x

0,068

B

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)

beija-flor-tesoura

V A

S U J

x

x

x

x

x

0,068

B

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)

beija-flor-de-orelha-violeta

V A (f)

S F

x

x

0,023

B

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)

besourinho-de-bico-vermelho

V A

S U J

x

x

x

x

x

0,027

B

Thalurania furcata (Gmelin, 1788)

beija-flor-tesoura-verde

V A (f)

S F U J

x

x

0,027

M

Amazilia lactea (Lesson, 1832)

beija-flor-de-peito-azul

V A (f)

S F U J

x

x

x

x

x

0,095

B

Heliomaster squamosus (Temminck, 1823)

bico-reto-de-banda-branca

V (f)

S J

x

x

0,009

M

Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783)

estrelinha-ametista

V (f)

S J

x

x

0,009

B

CORACIIFORMES**Alcedinidae***Megacyrle torquata* (Linnaeus, 1766)*

martim-pescador-grande

V A (f)

A U

x

x

x

x

0,050

B

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)*

martim-pescador-verde

V A (f)

F U J

x

x

x

x

x

0,063

B

Momotidae*Baryphthengus ruficapillus* (Vieillot, 1818)

juruva

A

F

x

0,005

M MA

GALBULIFORMES**Galbulidae***Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817)

cuitelão

V A (f)

F J

x

0,009

M MA;
VU(G
L),
QA(B)

												R)
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba	A	F U J	x		x	x	x	0,045	B		
PICIFORMES												
Ramphastidae												
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	V A (f)	A S F U J	x	x	x	x	x	0,099	M		
Picidae												
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	picapauzinho-barrado	V A	S F U J	x	x	x	x	x	0,108	B		
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	V A (f)	S F U	x		x	x	x	0,023	B		
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-pequeno	V A (f)	S F U J	x		x	x	x	0,027	B		
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	V A	S F U J	x	x	x	x	x	0,050	B		
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	V A (f)	S U J	x	x	x	x	x	0,063	B		
CARIAMIFORMES												
Cariamidae												
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema	V A (f)	S U J	x	x	x	x	x	0,068	M		
FALCONIFORMES												
Falconidae												
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará	V A (f)	A S U J	x		x	x	x	0,063	B		
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	V A (f)	A S U J	x		x	x	x	0,104	B		
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	V A (f)	S F		x		x	x	0,014	B		
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	A	S F			x	x	x	0,014	M		
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	V A	S		x			x	0,009	B		
PSITTACIFORMES												
Psittacidae												
<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão	V A	A S U			x	x		x	0,023	B	
<i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	V A (f)	A S	x	x	x	x	x	0,032	M		
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	V A (f)	A S F U J	x	x	x	x	x	0,153	B		
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	V A	A S F U J	x	x	x	x	x	0,108	M		
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca	V A (f)	A S F U J	x	x		x	x	0,072	M		
PASSERIFORMES												
Thamnophilidae												
<i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929	formigueiro-da-serra	V A (f)	S F	x			x		0,009	D	MA	

<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	A	F	x					0,005	M
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	0,131	M
<i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825	choca-de-asa-vermelha	A	S U			x	x	x	0,018	M
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	0,126	B
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	0,072	B
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	V A	F		x			x	0,014	M MA
Dendrocolaptidae										
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	V A (f)	F	x			x	x	0,018	M
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	V A	S U J		x	x	x	x	0,027	M
Xenopidae										
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	V A	F	x			x	x	0,014	M
Furnariidae										
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama	V A (f)	U J	x	x		x	x	0,050	B
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	0,104	B
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)*	joão-porca	A	U			x			0,005	M
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	A	F	x					0,005	M MA
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	A	F			x			0,005	M
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau	V A (f)	S U J	x	x	x	x	x	0,140	M
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)*	joão-botina-do-brejo	A	U	x	x		x		0,014	M MA
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)*	curutié	V A (f)	S U	x		x	x	x	0,099	M
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim	V A	S F U J	x	x	x	x	x	0,185	B
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	A	S F U	x		x	x	x	0,050	B
Pipridae										
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão	V A (f)	F				x		0,009	M
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	V A	F				x		0,005	B
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	V A (f)	F	x			x	x	0,032	M MA
<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)*	soldadinho	V A (f)	F U	x	x		x	x	0,095	M CE
Tityridae										
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	A	F				x		0,005	B
Platyrinchidae										
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	A	F	x			x		0,009	M

Rhynchocyclidae

<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	V A	F J	x	x	x	x	0,032	M
<i>Corythopis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador	V A	F			x		0,018	M
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	0,099	M
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	V A	S F U J	x		x	x	0,050	B MA
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	A	J		x			0,005	B
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	A	F		x		x	0,018	M
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	V A (f)	J			x		0,009	B MA
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro	V A	S J		x		x	0,023	M

Tyrannidae

<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	V A (f)	S J	x		x	x	0,014	B
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento	V A (f)	S		x		x	0,023	B
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	V A	S F U J	x	x	x	x	0,149	B
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	0,243	B
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande	A	U J		x		x	0,009	B
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme	V A	S		x		x	0,045	M
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum	V A (f)	S				x	0,009	B
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão	A	S J		x		x	0,027	M
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	A	F U J	x		x	x	0,050	M
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	0,063	B
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	V A	S F U J	x		x	x	0,059	M
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	A	S U J	x		x		0,045	B
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	0,050	B
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	0,162	B
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	A	F U J	x		x	x	0,032	B
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	maria-ferrugem	V A (f)	F				x	0,009	M
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	0,189	B
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	V A (f)	S U J	x	x	x	x	0,041	B
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	V A (f)	S J	x		x	x	0,014	B
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	A	S F U J	x		x	x	0,041	B

<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,095	B	
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca	V (f)	S					x		0,005	B	
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,099	B	
<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	tesourinha	V A (f)	S U J			x	x		x	0,018	B	
<i>Empidonax varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	V A	U J	x		x				0,009	B	
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	V A	F U J	x	x		x	x	x	0,027	B	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,108	B	
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)*	lavadeira-mascarada	V A (f)	S U J	x	x	x	x	x	x	0,099	B	
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)*	freirinha	V	U					x		0,005	M	
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	A	S F		x			x	x	x	0,018	B
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,063	M	
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	V A (f)	U		x	x	x	x	x	0,023	B	
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca	A	S U			x		x		0,014	M	
Vireonidae												
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,068	B	
<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,113	M	
<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviara	A	S F			x	x	x	x	0,018	B	
Corvidae												
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,063	M	CE
Hirundinidae												
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	V A (f)	A S F U J	x		x	x	x	x	0,099	B	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)*	andorinha-serradora	V A (f)	A S F U J	x	x	x	x	x	x	0,059	B	
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	V A (f)	U	x		x	x	x		0,018	B	
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)*	andorinha-do-rio	V (f)	U	x		x				0,018	B	
Troglodytidae												
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,216	B	
Donacobiidae												
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)*	japacanim	A	U				x	x		0,014	M	
Turdidae												
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-branco	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,122	B	
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	V A (f)	S F U	x	x		x	x	x	0,032	B	

<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,036	B
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,063	B
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	V A	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,189	B
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	V A (f)	U J	x		x				0,014	B
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	V A (f)	S U J	x		x	x			0,027	B
<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894)	papa-capim-de-costas-cinzas	V A (f)	U J	x						0,014	M MA
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	V	U	x						0,005	B
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)*	chorão	V	U					x		0,005	B
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro	V A (f)	S F U J	x	x	x		x		0,023	B
Fringillidae											
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	V A (f)	S F U J	x	x	x	x	x	x	0,108	B
Estrildidae											
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	V A (f)	S U J	x	x	x	x	x	x	0,059	D
Passeridae											
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	V A (f)	S J	x	x	x	x			0,050	B